

A prevenção de doenças infecciosas possibilita a redução da morbimortalidade e a melhoria da qualidade de vida. Com este calendário, que contempla as vacinas aprovadas para uso no Brasil e indicadas pelas sociedades médicas – sob a ótica da clínica para pessoas com diabetes –, a SBIm e a SBD esperam contribuir para a melhor prática médica.

Acesse o **GUIA DE IMUNIZAÇÃO SBIm/SBD – DIABETES 2019-2020:**
sbim.org.br/images/guias/guia-diabetes-sbim-sbd-2019-2020.pdf



Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm)

Rua Luís Coelho, 308 – 5º andar, Cj 54
São Paulo – SP – CEP: 01309-902
Tel: (11) 3255-5674
Fax: (11) 3255-9659
sbim@sbim.org.br
www.sbim.org.br



Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD)

Rua Afonso Braz, 579 - salas 72/74
Vila Nova Conceição, São Paulo - SP
CEP: 04511-011
www.diabetes.org.br

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO
DE PESSOAS COM
DIABETES
SBIm/SBD

2019/20

CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO DE PESSOAS COM DIABETES – SBIM/SBD – 2019/20

VACINAS	ESQUEMAS/RECOMENDAÇÕES	DISPONIBILIDADE NOS CRIE* e/ou UBS**
VACINAS ESPECIALMENTE RECOMENDADAS		
Influenza	<ul style="list-style-type: none"> Desde que disponível, a vacina influenza quadrivalente (4V) é preferível à vacina influenza trivalente (3V), por conferir maior cobertura das cepas circulantes. Na impossibilidade de uso da vacina 4V, utilizar a vacina 3V. Recomendar a partir dos 6 meses de idade, de acordo com calendários SBIm para cada faixa etária. 	SIM – nas UBS e nos CRIE; Vacina 3V NÃO – Vacina 4V
Pneumocócicas conjugadas (VPC10 ou VPC13)	<ul style="list-style-type: none"> Sempre que possível, utilizar a VPC13. Crianças: vacinar o mais precocemente possível a partir dos 2 meses de idade (número de doses dependerá da idade em que iniciar a vacinação). Ver <i>Calendário de vacinação SBIm criança</i>. Crianças não vacinadas anteriormente com a VPC13, mesmo que adequadamente vacinadas com a VPC10, iniciando entre 12 e 71 meses: duas doses de VPC13 com intervalo de dois meses. Crianças a partir de 6 anos, adolescentes, adultos e idosos não vacinados com VPC13: uma dose de VPC13. 	SIM – nas UBS e nos CRIE; VPC10 para menores de 5 anos. Para menores de 6 meses são disponibilizadas três doses e reforço após 12 meses de idade (esquema 3 + 1) NÃO – VPC13
Pneumocócica polissacarídica 23-valente (VPP23)	A partir dos 2 anos de idade: duas doses com intervalo de cinco anos entre elas. Se a segunda dose de VPP23 foi aplicada antes de 60 anos de idade, uma terceira dose está recomendada após essa idade, com intervalo mínimo de cinco anos da última dose.	SIM – nos CRIE; duas doses
Observações para esquema sequencial VPC13 e VPP23		
<ol style="list-style-type: none"> Sempre iniciar esquema com a vacina conjugada (VPC13), seguida pela aplicação da vacina VPP23, respeitando o intervalo mínimo de dois meses entre elas. Para indivíduos que já receberam a VPP23 e não anteriormente vacinados com VPC13, recomenda-se um intervalo de 12 meses para a aplicação de VPC13 e de cinco anos para a aplicação da segunda dose da VPP23, com intervalo mínimo de dois meses entre as vacinas conjugada e polissacarídica. 		
Haemophilus influenzae tipo b	<ul style="list-style-type: none"> Para menores de 5 anos: ver <i>Calendário de vacinação SBIm criança</i>. Crianças a partir de 1 ano, adolescentes e adultos não vacinados: uma dose. Para anteriormente vacinados mas que não receberam dose de reforço após os 12 meses de idade: uma dose. 	SIM – nas UBS para menores de 5 anos SIM – nos CRIE para menores de 19 anos
Hepatite B	Três doses: 0 - 1 - 6 meses.	SIM – nas UBS e nos CRIE
Varicela	Recomendar de acordo com calendários SBIm para cada faixa etária.	SIM – nas UBS para menores de 5 anos
Herpes zóster	Uma dose para maiores de 50 anos de idade.	NÃO
CONSIDERAÇÕES SOBRE O USO DE OUTRAS VACINAS RECOMENDADAS NOS CALENDÁRIOS PARA CADA FAIXA ETÁRIA		
BCG	Recomendar de acordo com o <i>Calendário de vacinação SBIm criança</i> .	SIM – nas UBS
Pólio inativada	Recomendar de acordo com o <i>Calendário de vacinação SBIm criança</i> .	SIM – nas UBS
Rotavírus	Recomendar de acordo com o <i>Calendário de vacinação SBIm criança</i> .	SIM – nas UBS
Triplíce bacteriana (DTPw ou DTPa) OU Tríplíce bacteriana do tipo adulto (dTpa) e suas combinações	Recomendar de acordo com calendários SBIm para cada faixa etária.	SIM – nas UBS; DTPw para menores de 7 anos dTpa para Gestantes e puérperas
SCR e SCR-V***	Recomendar de acordo com calendários SBIm para cada faixa etária.	SIM – nas UBS; SCR para menores de 50 anos e SCR-V para menores de 5 anos
Febre amarela	Recomendar de acordo com calendários SBIm para cada faixa etária.	SIM – nas UBS
Hepatite A	Recomendar de acordo com calendários SBIm para cada faixa etária.	SIM – nas UBS; dose única para menores de 5 anos
Meningocócicas conjugadas (MenC ou MenACWY)	Recomendar de acordo com calendários SBIm para cada faixa etária.	SIM – nas UBS; MenC para menores de 5 anos e adolescentes de 11 a 14 anos
Meningocócica B	Recomendar de acordo com calendários SBIm para cada faixa etária.	NÃO – MenACWY
HPV	Recomendar de acordo com calendários SBIm para cada faixa etária.	NÃO
Dengue	Se paciente soropositivo para dengue: recomendar de acordo com calendários SBIm para cada faixa etária. Não vacinar pacientes soronegativos para dengue.	SIM – nas UBS; HPV4, duas doses para meninas de 9 a 14 anos e para meninos de 11 a 14 anos.
VACINAS CONTRAINDICADAS		
Em vigência de imunossupressão, as vacinas vivas atenuadas estão contraindicadas: BCG, rotavírus, pólio oral (VOP), febre amarela, SCR, varicela, SCR-V, herpes zóster e dengue. No caso de paciente moderadamente imunocomprometido, avaliar parâmetros clínicos e risco epidemiológico para definir se é válida a recomendação das vacinas febre amarela, SCR, SCR-V, varicela e herpes zóster.		

05/08/2019

*A disponibilidade segue as normas contidas no Manual dos CRIE (Centros de Referência para Imunobiológicos Especiais), disponível em: <http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2014/dezembro/09/manual-cries-9dez-14-web.pdf>

** Unidade Básica de Saúde

*** SCR (sarampo, caxumba e rubéola) e SCR-V (sarampo, caxumba, rubéola e varicela)